



40 mg/ml orale suspensie / Suspension orale / Suspension zum Einnehmen
SIMETICON / SIMÉTHICONE



Mode d'emploi

INFACOL est disponible en flacon de 50 ml.


Indications

INFACOL suspension orale est utilisé dans le traitement des coliques du nourrisson. La douleur associée aux coliques peut être provoquée par la formation de petites bulles d'air dans les intestins. INFACOL aide à évacuer ces gaz.

Il peut être utilisé dès la naissance sans limitation de durée.

Action

INFACOL contient de la siméthicone à une concentration de 40 mg/ml comme composant principal. La siméthicone aide à évacuer l'air emprisonné dans l'estomac et les intestins. La siméthicone rassemble les petites bulles d'air en grandes bulles plus faciles à évacuer pour votre bébé.



Mode d'administration

Agitez préalablement le flacon. Remplissez la pipette en pressant à deux reprises le capuchon en caoutchouc. Éliminez l'excédent de produit le long de la pipette en passant celle-ci sur le rebord du goulot. Pour administrer Infacol, pressez le capuchon en caoutchouc et déposez les gouttes sur la langue de votre bébé. Le flacon contient environ 100 doses.

Posologie

Administrer une pipette remplie (0,5 ml) avant chaque repas. Au besoin, cette dose peut être temporairement portée à deux pipettes remplies (1 ml). Utilisez INFACOL pendant plusieurs jours consécutifs pour un meilleur résultat. L'utilisation sur une certaine durée peut aider à prévenir l'accumulation de gaz.

Avertissements

INFACOL siméthicone est inerte et n'est pas assimilé par l'organisme. INFACOL ne possède aucun effet secondaire connu. Le méthyle hydroxybenzoate et le propyle hydroxybenzoate peuvent entraîner des réactions allergiques (éventuellement différées). Si vous pensez que votre bébé est allergique à l'un des composants, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant toute utilisation.

Demandez conseil à votre médecin en cas de persistance des symptômes.



Conseils de conservation et date limite d'utilisation

Conserver en lieu sûr hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur le flacon et l'emballage.

Se conserve 28 jours après ouverture.



Merckle GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Germany

Laatste herziening bijsluiter: 09.2017
Dernière révision de la notice: 09.2017
Letzte Überarbeitung der Packungsbeilage:
09.2017

LF000208

CE 0482



295086.01-BE